

MAT2219 – Cálculo Diferencial e Integral III
Exercícios – 07/05/2018

PROF. CLAUDIO GORODSKI

II. Usando o Teorema de Green, calcule as seguintes integrais de linha:

(a) $\oint_{\gamma} x^2 y dx + xy^3 dy$, onde γ é o quadrado de vértices $(0,0)$, $(1,0)$, $(1,1)$ e $(0,1)$, orientado positivamente. Resp. $-1/12$.

(b) $\oint_{\gamma} (x+2y) dx + (x-2y) dy$, onde γ consiste no arco da parábola $y = x^2$ de $(0,0)$ a $(1,1)$ concatenado com o segmento de reta de $(1,1)$ a $(0,0)$, orientada positivamente. Resp. $1/6$.

(c) $\oint_{\gamma} (y + e^{\sqrt{x}}) dx + (2x + \cos y^2) dy$, onde γ é a fronteira da região delimitada pelas parábolas $y = x^2$ e $x = y^2$ percorrida no sentido anti-horário. Resp. $1/3$.

(d) $\oint_{\gamma} x^2 dx + y^2 dy$, γ é a curva $x^6 + y^6 = 1$, orientada no sentido anti-horário. Resp. 0.

(e) $\oint_{\gamma} xy dx + 2x^2 dy$, γ consiste no segmento de reta unindo $(-2,0)$ a $(2,0)$ e da semi-circunferência $x^2 + y^2 = 4$, $y \geq 0$, orientada positivamente. Resp. 0.

(f) $\oint_{\gamma} 2xy dx + x^2 dy$, γ é a cardióide $\rho = 1 + \cos \theta$ orientada positivamente. Resp. 0.

(g) $\oint_{\gamma} (xy + e^{x^2}) dx + (x^2 - \ln(1+y)) dy$, γ consiste no segmento de reta de $(0,0)$ a $(\pi,0)$ e do arco da curva $y = \sin x$, orientada positivamente. Resp. π .

(h) $\oint_{\gamma} \vec{F} \cdot d\vec{r}$, onde $\vec{F}(x,y) = (y^2 - x^2 y)\vec{i} + xy^2\vec{j}$ e γ consiste do arco de circunferência $x^2 + y^2 = 4$ de $(2,0)$ a $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$, e dos segmentos de reta de $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$ a $(0,0)$ e de $(0,0)$ a $(2,0)$. Resp. $\pi + \frac{16}{3} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - 1 \right)$.

III. Calcule

(a) $\int_{\gamma} x^2(5ydx + 7xdy) + e^y dy$, sendo γ a elipse $16x^2 + 25y^2 = 100$, percorrida de $(0,-2)$ a $(0,2)$ com $x \geq 0$. Resp. $e^2 - \frac{1}{e^2} + \frac{125}{2}\pi$.

(b) $\int_{\gamma} (2xe^y - x^2y - \frac{y^3}{3}) dx + (x^2e^y + \sin y) dy$, sendo γ a circunferência $x^2 + y^2 = 2x$, percorrida de $(0,0)$ a $(2,0)$ com $y \geq 0$. Resp. $4 - \frac{3\pi}{4}$.

(c) $\int_{\gamma} \vec{v} dr$, sendo γ a fronteira do retângulo $[1,2] \times [-1,1]$ e $\vec{v}(x,y) = 2 \arctan(\frac{y}{x})\vec{i} + (\ln(x^2 + y^2) + 2x)\vec{j}$, percorrida no sentido anti-horário. Resp. 4.

IV. Calcule

(a) $\int_{\gamma} \frac{-y dx + x dy}{x^2 + y^2}$, onde γ é a fronteira da região limitada pelas curvas $y^2 = 2(x+2)$ e $x = a$, com $a > 0$, orientada no sentido horário Resp. -2π .

(b) $\int_{\gamma} \frac{x dx + y dy}{x^2 + y^2}$, onde γ é a curva $y = x^2 + 1$, $-1 \leq x \leq 2$, percorrida do ponto $(-1, 2)$ a $(2, 5)$. Resp. $\frac{1}{2} \ln \frac{29}{5}$.

(c) $\int_{\gamma} \frac{y dx - (x-1) dy}{(x-1)^2 + y^2}$, onde γ é a circunferência $x^2 + y^2 = 4$, orientada no sentido horário. Resp. 2π .

(d) $\int_{\gamma} \frac{x^2 y dx - x^3 dy}{(x^2 + y^2)^2}$, onde γ é a fronteira da região $R = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 : |x| \leq 1, |y| \leq 1\}$, orientada no sentido horário. Resp. π .

V. Verifique que a integral $\int_{\gamma} 2x \sin y dx + (x^2 \cos y - 3y^2) dy$, onde γ é uma curva ligando $(-1, 0)$ a $(5, 1)$, é independente do caminho e calcule o seu valor. Resp. $25 \sin 1 - 1$.

VI. Seja γ uma curva plana simples, fechada e lisa por partes, percorrida uma vez no sentido horário. Dê todos os valores possíveis para:

$$(a) \int_{\gamma} \frac{-y dx + x dy}{x^2 + y^2}. \quad (b) \int_{\gamma} \frac{-y dx + x dy}{4x^2 + 9y^2}.$$

Resp. (a) 0 ou -2π ; (b) 0 ou $-\frac{\pi}{3}$.

VII. Determine todos os valores possíveis da integral

$$\int_{(1,0)}^{(2,2)} \frac{-y dx + x dy}{x^2 + y^2}$$

sobre um caminho que não passe pela origem.

VIII. Calcule $\int_{\gamma} \vec{F} d\vec{r}$ onde $\vec{F} = \left(\frac{-y}{x^2 + \frac{y^2}{9}} + y, \frac{x}{x^2 + \frac{y^2}{9}} + 3x \right)$ sendo:

(a) γ é a curva $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 4$, percorrida uma vez no sentido horário. Resp. -8π .

(b) γ é a curva $(x-1)^2 + y^2 = 4$, percorrida uma vez no sentido horário. Resp. -14π .

IX. Calcule

(a) $\int_{\gamma} (-2xy + x^2) dx + \sqrt{8-y^7} dy$, onde γ é o gráfico de $y = \cos x$, no intervalo $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$, percorrido no sentido de x crescente. Resp. $\frac{\pi^3}{12}$.

(b) $\int_{\gamma} \left(\frac{2xy^2}{x^2 + 1} \right) dx + (2y \ln(x^2 + 1)) dy$, onde γ é o arco da elipse $4x^2 + y^2 = 1$ do ponto $(0, 1)$ ao ponto $(\frac{1}{2}, 0)$ percorrido no sentido anti-horário. Resp. 0.

(c) $\int_{\gamma} \left(\frac{-y}{x^2 + y^2} \right) dx + \left(\frac{x}{x^2 + y^2} + xy \right) dy$ onde γ é a fronteira da região no plano determinada pelas desigualdades $y \geq x - 1$ e $y^2 \leq x + 1$, orientada no sentido anti-horário. Resp. $2\pi + \frac{9}{4}$.

(d) $\int_{\gamma} (2xy + \sin(y))dx + x \cos(y)dy + x^2 dz$ onde γ é a intersecção das superfícies $3x^2 + y^2 + z^2 = 1$ e $y = x$, no 1º octante e orientada de forma que a sua projecção no plano yz seja percorrida no sentido horário. Resp. $\frac{1}{12} (6 \sin(\frac{1}{2}) - 1)$.

(e) $\int_{\gamma} \frac{-y}{x^2 + 2y^2} dx + \frac{x}{x^2 + 2y^2} dy$ onde γ é a circunferência de centro $(0, 1)$ e raio 3, percorrida no sentido horário. O campo $\vec{F}$ é conservativo? Justifique sua resposta. Resp. -2π .

X. Seja o campo $\vec{F}(x, y) = \frac{x\vec{i} + y\vec{j}}{x^2 + y^2}$ e γ a curva dada por $\gamma(t) = (e^t, \sin t)$ para $0 \leq t \leq \pi$. Calcule $\int_{\gamma} \vec{F} d\vec{r}$. Resp. π .

XI. Calcule as integrais

(a) $\int_{\gamma} 7x^6 y dx + x^7 dy$ sendo $\gamma(t) = (t, e^{t^2-1})$, onde $t \in [0, 1]$. Resp. 1.

(b) $\int_{\gamma} [\ln(x + y^2) - y] dx + [2y \ln(x + y^2) - x] dy$ sendo γ a curva $(x - 2)^2 + y^2 = 1$ com $y \geq 0$ orientada no sentido horário. Resp. $3 \ln 3 - 2$.

(c) $\int_{\gamma} \frac{y dx - x dy}{x^2 + y^2}$ sendo γ a curva dada por $x(t) = \cos^3 t$ e $y(t) = \sin^3 t$ com $y \geq 0$ ligando os pontos $(1, 0)$ e $(0, 1)$, nessa ordem. Resp. $-\frac{\pi}{2}$.

XII. Mostre que as integrais abaixo independem do caminho e calcule-as.

(a) $\int_{(1,1)}^{(a,b)} 2xy dx + (x^2 - y^2) dy$. Resp. $a^2 b - \frac{b^3}{3} - \frac{2}{3}$.

(b) $\int_{(0,0)}^{(a,b)} \sin y dx + x \cos y dy$. Resp. $a \sin b$.

XIII. Para cada campo $\vec{F}$ encontre uma curva fechada simples α , tal que $\int_{\alpha} \vec{F} d\vec{r} \neq 0$. Podemos concluir que os campos não são conservativos?

(a) $\vec{F} = (y^2 + xy, 3y^2)$.

(b) $\vec{F} = (e^{xy}, e^{-xy})$.

XIV. Calcule

(a) $\int_{(1,1,2)}^{(3,5,0)} yz dx + xz dy + xy dz$. Resp. -2 .

(b) $\int_{\gamma} \sin(yz) dx + xz \cos(yz) dy + xy \cos(yz) dz$, sendo γ a hélice $x(t) = \cos t$, $y(t) = \sin t$, $z(t) = t$ para $t \in [0, \frac{\pi}{4}]$. Resp. $\frac{\sqrt{2}}{2} \sin\left(\frac{\sqrt{2}\pi}{8}\right)$.

XV. Sejam um ponto A pertencente à esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ e um ponto B pertencente à esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$. Calcule $\int_A^B \frac{x dx + y dy + z dz}{x^2 + y^2 + z^2}$. Resp. $\ln 2$.

32. Se $\vec{n}(x, y)$ é vetor unitário normal ao traço da curva γ em (x, y) , calcule $\int_{\gamma} \vec{F} \cdot \vec{n} ds$

sendo:

(a) $\vec{F}(x, y) = x^{10}\vec{i} + (3x - 10x^9y)\vec{j}$ e γ a parte da circunferência $x^2 + y^2 = 1$ contida no primeiro quadrante, $\vec{n}$ normal exterior à circunferência. Resp. $-\frac{1}{11}$.

(b) $\vec{F}(x, y) = x^3y^3\vec{i} - \frac{3x^2y^4 + 2}{4}\vec{j}$ e $\gamma(t) = (t^3, \sin(4 \arctan t^2))$, $t \in [0, 1]$, $n \cdot \vec{j} \leq 0$. Resp. $\frac{1}{2}$.